



## Осторожно - ЧЕСОТКА

**Чесотка** - это заразное паразитарное заболевание.

**Возбудитель болезни** - чесоточный клещ.

**Способ заражения** - непосредственный контакт с больным человеком или пользование предметами зараженного человека.

Дети заражаются непосредственно друг от друга и через игрушки, или в семье, где есть больной.

**Признаки чесотки** - кожный зуд, мелкоточечные высыпания в виде пузырьков, располагающиеся на складках между пальцами рук, на коже, груди, живота, поясницы, ягодицы, внутренней поверхности бедра. Кроме того у детей - на подошвах, ладонях, внутренних краях стоп, на лице.

**Профилактика** - соблюдение правил гигиены: не надевать чужую одежду, верхнюю одежду проглаживать горячим утюгом, кипячение постельного и нательного белья, влажная уборка.

## Осторожно - СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ!

**Стригущий лишай** -

наиболее распространенное заразное заболевание, передающееся людям от животных, главным образом бродячих кошек и собак.

**Форма проявления болезни** - шелушащиеся очаги на коже лица, шеи, рук, спине, волосистой части головы.

**Возбудители болезни** - грибы-паразиты. источники заражения - больные люди, животные. Заразиться можно через вещи, предметы, которыми пользовался больной. При первых признаках заболевания у детей - плешинки на голове или шелушащихся пятен на коже лица, шеи, спины - необходимо немедленно обратиться к врачу.

**Профилактика:** соблюдение правил личной гигиены (регулярное мытье рук, использование индивидуальных гигиенических предметов - расческа, полотенце и т.п.), не допускать контактов с бродячими животными.



## Краснуха

**Описание:** распространенное заразное вирусное заболевание с характерной сыпью.

**Что нужно знать:**

- прививка обеспечит иммунитет;
- краснуха несколько напоминает корь, но длится обычно 3 дня и переносится легче. Симптомы простуды минимальны;
- это заболевание практически безвредно для детей, за исключением плода в утробе матери;
- ребенок заразен уже за 7 дней до появления сыпи и заканчивая 5-м днем после ее исчезновения. Инкубационный период — 14—21 день;
- чрезвычайно редко осложняется энцефалитом и повышенной кровоточивостью.

**Обратитесь к врачу, если:**

- у ребенка появились симптомы краснухи;
- беременная женщина имела контакт по краснухе (особенно опасно это в первые 3 месяца беременности). Врач может рекомендовать меры для защиты плода от тяжелых нарушений развития (врожденные слепота, глухота, пороки сердца).

**Симптомы:**

- течение краснухи может быть таким мягким, что симптомы трудно обнаружить;
- невысокая температура и небольшой насморк, через 1—2 дня — сыпь;
- увеличенные задние шейные лимфатические узлы, лимфатические узлы за ушами;
- сыпь в виде маленьких, красных, слегка выпуклых пятнышек обычно появляется сначала на лице и в течение дня распространяется на все тело. Исчезает, как правило, за три дня.

**Лечение:**

- при температуре и болях давайте парацетамол.



## Скарлатина

Скарлатина — это инфекционное заболевание детского возраста. Возбудителем скарлатины является стрептококк. Источником инфекции является больной человек и носитель данной инфекции.

Больной считается заразным с первых часов недуга. Возбудитель от больного человека выделяется в окружающую среду при кашле, чиханье, вместе с выделениями из носа. Путь передачи инфекции при скарлатине — воздушно-капельный. Также заражение скарлатиной может происходить и через инфицированные вещи и через третьих лиц.


Особую важную роль играют те предметы, которыми пользовался больной человек (игрушки, чашки, ложки и т. д.) Любые предметы, находящиеся в непосредственной близости от больного, могут быть заражены выделяемыми им каплями слизи.

И, наконец, еще один путь передачи инфекции — через пищу, главным образом через молоко и молочные продукты, но этот способ заражения редок.

Особое значение имеют формы скарлатины, протекающие в виде обычной ангины. Ангина является частым спутником скарлатины. Возможность заражения скарлатиной через воздух создается лишь на относительно близких расстояниях от больного.

Стрептококк, попавший в организм ребенка, начинает выделять ядовитое вещество — токсин. Начало заболевания острое, почти внезапное. Температура тела быстро повышается, одновременно появляются недомогание, слабость, учащенное сердцебиение. Ребенок становится капризным, вялым, ему хочется полежать, он жалуется на головную боль. Почти сразу же с повышением температуры появляются боли при глотании.

При осмотре зева отмечаются явления ангины — яркое покраснение зева, налеты на миндалинах. Может быть припухлость шейных лимфоузлов. Они становятся болезненными.



## Скарлатина

**Описание:** вариант стрептококковой инфекции, вызывающей ангину и сыпь на коже, а также другие симптомы.

**Что нужно знать:**

- скарлатина хорошо лечится антибиотиками;
- она довольно часто встречается и легко передается воздушно-капельным и контактным путями. После заболевания возникает иммунитет. В то же время описаны повторные случаи заболевания скарлатиной, которые могут быть связаны с ослаблением защитных сил организма и с изменением штамма микроорганизма, вызывающего болезнь;
- осложнения редки, но могут быть опасными.

**Обратитесь к врачу, если:**

- вы подозреваете у ребенка скарлатину (лечение обязательно должен назначить врач);
- проявления этой болезни тяжелые (немедленно вызывайте врача!).

**Симптомы:**

- часто начинается с головной боли, рвоты, боли в горле, повышения температуры;
- выступающая грубая на ощупь точечная красная сыпь появляется на всем теле на 1—2-й день болезни;
- могут увеличиться лимфатические узлы на шее.

**Что проверить:**

- точечная красная сыпь на ощупь напоминает наждачную бумагу. При надавливании пятна на время белеют;
- сыпь сгущается в паху, под мышками, на внутренних поверхностях рук и ног.

**Лечение:**

- вызовите врача. Он назначит антибиотики для приема внутрь или уколы;
- при высокой температуре давайте парацетамол;
- рекомендованы прохладное питье, щадящая пища;
- изолируйте ребенка на 10 дней;
- при тяжелом и осложненном течении требуется госпитализация.

